

Наукове видання



ISSN 1683 - 4720

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАУК УКРАЇНИ

ПРАЦІ
ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
І МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ

Том 32

Том 32, 2018

Том 32

Підписано до друку 28.12.2018

Інститут прикладної математики і механіки
НАН України

84100, м. Слов'янск, вул. Добровольського, 1;
тел.: (0626) 66 55 00

Формат 60 x 84 1/8. Ум. адрук. арк. 10.
Друк лазерний. Зам № 5540. Тираж 100 прим.

Надруковано в ТОВ "ТехПринтЦентр"
Адреса: м. Слов'янск, вул. Батюка, 19,
тел.: +38 06262 3 20 99

Праці ІПММ НАН України,

ПРАЦІ

ІНСТИТУТУ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ І
МЕХАНІКИ
НАН УКРАЇНИ

2018

Науковий збірник "Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України" публікує оригінальні статті в галузі фундаментальної та прикладної математики. Всі статті проходять рецензування міжнародною редакційною колегією.

Обсяг: 10 друк. арк.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 року № 326 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України.

Головний редактор: Скрипник І.І. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Україна)

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Апанасов Б.М. (Університет Оклахоми, США)
Бракалова М.А. (Фордемський університет, США)
Бахтін О.К. (Інститут математики НАН України, Україна)
Бойчук О.А. (Інститут математики НАН України, Україна)
Водопьянов С.К. (Інститут математики ім. С.Л. Соболева СО РАН, Росія)
Гольберг А. (Технологічний інститут Холона, Ізраїль)
Гутляньський В. Я. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Україна)
Діаконов К.М. (Університет Барселони, Іспанія)
Діблік Й. (Технічний університет Брно, Чеська Республіка)
Слізаров О.М. (Інститут математики і механіки ім. М.І. Лобачевського, Росія)
Зуєв О.Л. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Україна)
Каранджулов Л.І. (Технічний університет - Софія, Болгарія)
Кісляков С.В. (Санкт-Петербурзьке відділення Математичного інституту ім. В.А. Стеклова РАН, Росія)
Кононов Ю.М. (Донецький національний університет ім. В.Стуса, Україна)
Кореновський А.О. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна)
Крушкаль С.Л. (Університет ім. Бар-Ілана, Ізраїль)
Ліфланд Е. (Університет ім. Бар-Ілана, Ізраїль)
Маркіна І. (Бергенський університет, Норвегія)
Моторний В.П. (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Україна)
Насиров С.Р. (Інститут математики і механіки ім. М.І. Лобачевського, Росія)
Несмелова О.В. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Україна) – **відповідальний секретар**
Плакса С.А. (Інститут математики НАН України, Україна)
Покровський А.В. (Інститут математики НАН України, Україна)
Прохоров Д.В. (Саратовський державний університет, Росія)
Рязанов В.І. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Україна)
Севостьянов Є.О. (Житомирський державний університет ім. І. Франка, Україна)
Скляр Г. М. (Інститут математики Щецинського університету, Польща)
Чайченко С.О. (Донбаський державний педагогічний університет, Україна)
Чуйко С.М. (Донбаський державний педагогічний університет, Україна)
Шевченко В.П. (Донецький національний університет ім. В.Стуса, Україна)
Шишков А.Є. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Україна)
Щербак В.Ф. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Україна) – **заступник головного редактора**
Щербаков В.О. (Інститут математики і інформатики АНМ, Молдова)
Якубчик Б. (Інститут математики ПАН, Польща)

Адрес редколлегии: 84100 Слов'янск, вул. Добровольського, 1
Інститут прикладної математики і механіки НАН України,
Тел. (0626) 66 55 00

Затверджено до друку Вченою радою Інституту прикладної математики і механіки НАН України
10.12.2018 протокол № 12

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 22887-12787 ПР від 03.07.2017 р.

© Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2018

The journal "Proceedings of the Institute of Applied Mathematics and Mechanics of NAS of Ukraine" is devoted to the publication of original papers in pure and applied mathematics, and is reviewed and edited by an international editorial board.

Volume: 10 prints. the arch.

According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 04.04.2018 No. 326 the journal is included in the List of scientific professional editions of Ukraine

Editor-in-Chief: Skrypnik I. (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, Ukraine)

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Apanasov B. (The University of Oklahoma, USA)
Brakalova M. (Fordham University, USA)
Bakhtin A. (Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine, Ukraine)
Boichuk O. (Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine, Ukraine)
Vodopyanov S. (Sobolev Institute of Mathematics SB of the RAS, Russia)
Golberg A. (HIT-Holon Institute of Technology, Israel)
Gutlyanskiy V. (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, Ukraine)
Dyakonov K. (University of Barcelona, Spain)
Diblik J. (Brno University of Technology, Czech Republic)
Elizarov A. (N.I. Lobocevskii Institute of Mathematics and Mechanics, Russia)
Zuyev O. (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, Ukraine)
Karandzhulov L. (The Technical University of Sofia, Bulgaria)
Kislyakov S. (St. Petersburg Department of Steklov Mathematics Institute of the RAS, Russia)
Kononov Yu. (Vasyl' Stus Donetsk National University, Ukraine)
Korenovskiy A. (Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine)
Krushkal S. (Bar-Ilan University, Israel)
Liflyand E. (Bar-Ilan University, Israel)
Markina I. (The University of Bergen, Norway)
Motorny V. (Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine)
Nasyrov S. (N.I. Lobocevskii Institute of Mathematics and Mechanics, Russia)
Nesmelova O. (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, Ukraine) – **Executive Secretary**
Plaksa S. (Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine, Ukraine)
Pokrovskii A. (Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine, Ukraine)
Prokhorov D. (Saratov State University, Russia)
Ryazanov V. (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, Ukraine)
Sevost'yanov E. (Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine)
Sklyar G. (The Institute of Mathematics University of Szczecin, Poland)
Chaichenko S. (Donbas State Pedagogical University, Ukraine)
Chuiiko S. (Donbas State Pedagogical University, Ukraine)
Shevchenko V. (Vasyl' Stus Donetsk National University, Ukraine)
Shishkov A. (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, Ukraine)
Shcherbak V. (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, Ukraine) – **Deputy Editor-in-Chief**
Shcherbacov V. (Institute of Mathematics and Computer Science of the ASM, Moldova)
Jakubczyk B. (Institute of Mathematics of the PAS, Poland)

Editorial Address: 84100 Slovyansk, Dobrovolsky str., 1
Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Tel. (0626) 66 55 00

Approved for publication by the Academic Council of the Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, December 10, 2018 protocol 12
Certificate of registration: series KB No. 22887-12787 PIP from 07.03.2017.

© Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the NAS of Ukraine, 2018

Том 32

Слов'янськ, 2018

Заснований у 1997 р.

ПРАЦІ
ІНСТИТУТУ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
І МЕХАНІКИ
НАН УКРАЇНИ

З М І С Т

<i>А.К. Бахтин, И.Я. Дворак</i> Задача об экстремальном разбиении плоскости	3
<i>Л.В. Вигівська</i> Задача про екстремальне розбиття комплексної площини з фіксованими полюсами на колі	10
<i>С.В. Грициук</i> Моногенні функції у двовимірних комутативних алгебрах для рівнянь плоскої ортотропії	18
<i>V. Gutlyanskiĭ, V. Ryazanov, E. Yakubov</i> Dirichlet problem for Poisson equations in Jordan domains	30
<i>И.В. Денега</i> Некоторые оценки для экстремального разбиения комплексной плоскости	42
<i>Н.В. Жоголева</i> Нелинейные ангармонические возмущения поверхностных волн Лява при жестком закреплении волновода ...	48
<i>Н.В. Жоголева, В.Ф. Щербак</i> Синхронизация колебаний связанных осцилляторов Ван дер Поля по неполной информации	56
<i>Ю.М. Кононов, Ю.О. Джуха</i> Про спрощення частотного рівняння власних осесиметричних коливань ідеальної рідини в жорсткому циліндричному резервуарі з пружними основами	67

<i>О.В. Несмелова</i> Нелинейные краевые задачи для невырожденных дифференциально-алгебраических систем	78
<i>О.А. Новиков, О.Г. Ровенская</i> Интегральные представления уклонений прямоугольных линейных средних рядов Фурье на классах периодических дифференцируемых функций	92
<i>В.И. Рязанов, Р.Р. Салимов</i> О непрерывности по Гёльдеру решений уравнений Бельтрами на границе	104
<i>Е.А. Севостьянов, С.А. Скворцов</i> О локальном поведении одного класса обратных отображений	115
<i>А.С. Сенченко</i> Взаимосвязи между пересечением, объединением и другими сигнатурными операциями в табличных алгебрах	121
<i>С.М. Чуйко, Е.В. Чуйко, Я.В. Калиниченко</i> О регуляризации линейной нетеровой краевой задачи для системы разностных уравнений	133
<i>М.О. Шань</i> Априорні оцінки типу Келлера–Оссермана для двічі нелінійних анізотропних параболічних рівнянь з абсорбцією	149
<i>В.С. Шпаківський</i> Гіперкомплексний метод розв'язування лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними	160
<i>В.Ф. Щербак, И.С. Дмитришин</i> Оценка скорости колебаний осцилляторных сетей	182

UDK 517.9

©2018. М.О. Шань

АПРІОРНІ ОЦІНКИ ТИПУ КЕЛЛЕРА–ОССЕРМАНА ДЛЯ ДВІЧІ НЕЛІНІЙНИХ АНІЗОТРОПНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ З АБСОРБЦІЄЮ

Отримано поточкові оцінки зверху для розв'язків двічі нелінійних анізотропних параболічних рівнянь з абсорбційним членом, які виражені у термінах відстані до межі. Оцінки такого типу беруть свій початок в роботах Дж. Б. Келлера, Р. Оссермана і мають значення для так званих великих розв'язків.

MSC: 35B45.

Ключові слова: априорні оцінки, анізотропні параболічні рівняння

1. Вступ.

У даній статті отримано априорні оцінки типу Келлера–Оссермана для невід'ємних розв'язків анізотропних параболічних рівнянь з абсорбційним членом. Такі оцінки мають важливе значення в теорії існування і неіснування так званих великих розв'язків, ініційованих К. Бандле і М. Маркусом [1], а також у задачах регулярності, усунутості ізольованих особливостей.

Відмітимо, що перші оцінки такого типу були зроблені для рівняння p -Лапласу з абсорбційним членом

$$\Delta_p u = u^q, x \in \Omega \subset R^n, q > p - 1$$

Дж. Келлером [2] і Р. Оссерманом [3] при $p = 2$, і розповсюджені на випадок, коли $p \neq 2$ Д. Васкесом [4]: будь-який невід'ємний розв'язок $u \in C^2(\Omega)$ задовольняє нерівності

$$u(x) \leq c \operatorname{dist}(x, \partial\Omega)^{-\frac{p}{q-p+1}}, f(u) = u^q,$$

де $\operatorname{dist}(x, \partial\Omega)$ відстань до межі і $c = c(p, q, n)$.

Відомо, що такі оцінки для розв'язків еліптичних і параболічних рівнянь пов'язані з рівняннями, для яких мають місце теореми порівняння. Для ознайомлення з результатами дивіться [5–8] і на посилання в них. Анізотропні еліптичні та параболічні рівняння були об'єктом дослідження невеликої кількості робіт, оскільки для них немає принципу порівняння, і основні роботи стосуються рівнянь тільки з конкретним членом абсорбції, а саме $f(u) = u^q$ (див. [9–18]). Взагалі анізотропні рівняння мало вивчені, якісна теорія для них не побудована, тому останнім часом зростає зацікавленість в дослідженні якісних властивостей розв'язків цих рівнянь.

Роботу виконано за підтримки гранту 0118U003138 Міністерства освіти і науки України.

2. Постановка задачі і основний результат.

В обмеженій області $\Omega_T = \Omega \times (0, T)$, $0 < T < \infty$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$ розглянемо невід’ємні розв’язки квазілінійного параболічного рівняння другого порядку у дивергентному вигляді

$$u_t - \operatorname{div} A(x, t, u, \nabla u) + a_0(u) = 0, \quad (x, t) \in \Omega_T. \quad (1)$$

На коефіцієнти рівняння $A = (a_1, \dots, a_n)$ і a_0 будемо накладати наступні умови

- $A = (a_1, \dots, a_n)$ і a_0 задовольняють умові Каратеодорі
-

$$A(x, t, u, \xi) \xi \geq \nu_1 \sum_{i=1}^n |u|^{(m_i-1)(p_i-1)} |\xi_i|^{p_i},$$

$$|a_i(x, t, u, \xi)| \leq \nu_2 u^{(m_i-1) \frac{p_i-1}{p_i}} \left(\sum_{j=1}^n |u|^{(m_j-1)(p_j-1)} |\xi_j|^{p_j} \right)^{1-\frac{1}{p_i}}, \quad i = \overline{1, n}, \quad (2)$$

$$a_0(u) \geq \nu_1 f(u),$$

де ν_1, ν_2 додатні сталі, $f(u)$ – неперервна, додатня функція та для показників m_i, p_i справедливі нерівності

$$2 < p_1 \leq \dots \leq p_n, \quad \min_{1 \leq i \leq n} m_i > 1, \quad \max_{1 \leq i \leq n} m_i(p_i - 1) \leq 1 + \frac{\kappa}{n}, \quad p < n, \quad (3)$$

де $\kappa = n(p(m-d) - 1) + p$, $d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{p_i}$.

Не втрачаючи спільності, будемо вважати, що $m_n = \max_{1 \leq i \leq n} m_i$.

Введемо необхідні означення.

Означення 1. Будемо казати, що функція φ належить простору $V_{p,m}(\Omega_T)$, якщо $\varphi \in C(0, T, L^2(\Omega))$ і $\sum_{i=1}^n \iint_{\Omega_T} |\varphi|^{(m_i-1)(p_i-1)} |\varphi_{x_i}|^{p_i} dx dt < \infty$.

Означення 2. Будемо казати, що u – слабкий розв’язок рівняння (1), якщо $u \in V_{p,m}(\Omega_T)$ і для будь-якого інтервалу $(t_1, t_2) \subset (0, T)$ справедлива інтегральна тотожність

$$\int_{\Omega} u \varphi dx \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \{-u \varphi_t + A(x, t, u, \nabla u) \nabla \varphi + a_0(u) \varphi\} dx dt = 0 \quad (4)$$

для всіх $\varphi \in \overset{o}{V}_{p,m}(\Omega_T)$.

Зауваження 1. Умова (3) гарантує локальну обмеженість слабкого розв'язку рівняння (1) ([19]).

Для формулювання головного результату введемо наступні позначення. Зафіксуємо довільну точку $(x^{(0)}, t^{(0)}) \in \Omega_T$, для будь-яких $\tau, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n > 0$, $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ визначемо циліндри $Q_{\theta, \tau}(x^{(0)}, t^{(0)}) := \{(x, t) : |t - t^{(0)}| < \tau, |x_i - x_i^{(0)}| < \theta_i, i = \overline{1, n}\}$ і позначемо $M(\theta, \tau) := \sup_{Q_{\theta, \tau}(x^{(0)}, t^{(0)})} u$, $\delta(\theta, \tau) := \sup_{Q_{\theta, \tau}(x^{(0)}, t^{(0)})} \delta(u)$, $\Phi(\theta, \tau) :=$

$$\sup_{Q_{\theta, \tau}(x^{(0)}, t^{(0)})} \Phi(u), \Phi(u) = \int_0^u g(s) ds, \quad g(s) = s^{m_n-1} f(s).$$

Теорема 1. Нехай виконані умови (2), (3) і u – невід'ємний слабкий розв'язок рівняння (1), припустимо також, що $f \in C^1(\mathbb{R}_+^1)$ і $f'(u) \geq 0$. Зафіксуємо точку $(x^{(0)}, t^{(0)}) \in \Omega_T$ і нехай $\sigma \in (0, 1)$, $\tau \in (0, \min(\theta_n^{p_n}, t^{(0)}, T - t^{(0)}))$, $\theta_i \in (0, \theta_n)$ для $i \in I' = \{i = \overline{1, n} : m_i(p_i - 1) < m_n(p_n - 1)\}$ і $\theta_i = \theta_n$ для $i \in I'' = \{i = \overline{1, n} : m_i(p_i - 1) = m_n(p_n - 1)\}$. Тоді існують додатні сталі c_1, c_2 , які залежать лише від $n, \nu_1, \nu_2, m_1, \dots, m_n, p_1, \dots, p_n$, що виконується

$$u(x^{(0)}, t^{(0)}) \leq (\tau^{-1} \rho^{p_n})^{\frac{1}{m_n(p_n-1)-1}} + \sum_{i \in I'} (\theta_i^{-1} \theta_n^{\frac{p_n}{p_i}})^{\frac{p_i}{m_n(p_n-1)-m_i(p_i-1)}}, \quad (5)$$

або

$$\Phi(\sigma\theta, \sigma\tau) \leq c_1(1 - \sigma)^{-c_2} \theta_n^{-p_n} \delta(\theta, \tau) M^{m_n p_n - 1}(\theta, \tau). \quad (6)$$

У випадку, коли I' пуста множина, тобто $m_1(p_1 - 1) = m_2(p_2 - 1) = \dots = m_n(p_n - 1)$, або справедлива оцінка

$$u(x^{(0)}, t^{(0)}) \leq (\tau^{-1} \theta_n^{p_n})^{\frac{1}{m_n(p_n-1)-1}}, \quad (7)$$

або (5) має місце.

3. Доведення основного результату.

3.1 Допоміжний матеріал

Лема 1. ([20]) Нехай $\Omega \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$ обмежена множина, $u \in \overset{o}{W}^{1,1}(\Omega)$, тоді справедлива наступна нерівність

$$\|u\|_{L^q(\Omega)} \leq \gamma \prod_{i=1}^n \left(\int_{\Omega} |u_{x_i}| dx \right)^{\frac{1}{n}}, \quad q = \frac{n}{n-1},$$

де додатня стала γ залежить лише від n .

Лема 1. ([21]) Нехай для послідовності невід'ємних чисел $\{y_j\}_{j \in \mathbb{N}}$, $j = 0, 1, 2, \dots$ виконується нерівність

$$y_{j+1} \leq C b^j y_j^{1+\varepsilon},$$

де $\varepsilon, C > 0, b > 1$. Тоді справедлива оцінка

$$y_j \leq C \frac{(1+\varepsilon)^{j-1}}{\varepsilon} b \frac{(1+\varepsilon)^{j-1}}{\varepsilon^2} - \frac{j}{\varepsilon} (1+\varepsilon)^j y_0.$$

Зокрема, якщо $y_0 \leq C^{-\frac{1}{\varepsilon}} b^{-\frac{1}{\varepsilon^2}}$, тоді $\lim_{j \rightarrow \infty} y_j = 0$.

3.2 Допоміжні результати

Зафіксуємо довільну точку $(\bar{x}, \bar{t}) \in \Omega_T$, для будь-яких $\eta_1, \dots, \eta_n > 0, \eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ і $s > 0$ визначимо циліндри $Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t}) := Q_{\eta}(\bar{x}) \times (\bar{t} - s, \bar{t} + s)$, щоб $Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t}) \subset \Omega_T$ через ζ позначимо невід'ємну кусково-гладку функцію, що обертається в 0 на параболічній межі $Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})$. Будемо вважати, що

$$2 < p_1 \leq \dots \leq p_{n-1} < p_n, \quad \min_{1 \leq i \leq n} m_i > 1, \quad m_n(p_n - 1) \leq 1 + \frac{\kappa}{n}, \quad p < n. \quad (8)$$

Через γ позначимо сталу, яка залежить тільки від $n, \nu_1, \nu_2, p_1, \dots, p_n, m_1, \dots, m_n$ і змінюється від рядка до рядка.

Лема 3. Нехай u — невід'ємний слабкий розв'язок рівняння (1) і нехай виконані умови (2), (3). Тоді для кожного циліндру $Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t}) \subset \Omega_T$ і для кожної додатньої сталої k виконується нерівність

$$\begin{aligned} & \sup_{|t-\bar{t}|<s} \int_{Q_{\eta}(\bar{x})} (\Phi(u) - k)_+^2 \zeta^{p_n} dx + \sum_{i=1}^n \iint_{A_{k,\eta,s}} g^2(u) u^{(m_i-1)(p_i-1)} |u_{x_i}|^{p_i} \zeta^{p_n} dx dt + \\ & + \iint_{A_{k,\eta,s}} f(u) g(u) (\Phi(u) - k)_+ \zeta^{p_n} dx dt \leq \gamma \iint_{A_{k,\eta,s}} (\Phi(u) - k)_+^2 |\zeta_t| \zeta^{p_n-1} dx dt + \\ & + \gamma \sum_{i=1}^n \iint_{A_{k,\eta,s}} (\Phi(u) - k)_+^2 \delta^{p_i-2}(u) u^{(m_i-1)(p_i-1)} |\zeta_{x_i}|^{p_i} dx dt, \end{aligned} \quad (9)$$

де $A_{k,\eta,s} = \{(x, t) \in Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t}) : \Phi(u) > k\}$.

Доведення. В інтегральну тотожність (4) підставимо пробну функцію $\varphi =$

$(\Phi(u) - k)_+ g(u) \zeta^p$. Застосувавши умову (2), отримаємо

$$\begin{aligned} & \sup_{|t-\bar{t}|<s} \int_{Q_\eta(\bar{x})} (\Phi(u) - k)_+^2 \zeta^{p_n} dx + \iint_{A_{k,\eta,s}} f(u)g(u)(\Phi(u) - k)_+ \zeta^{p_n} dxdt + \\ & + \sum_{i=1}^n \iint_{A_{k,\eta,s}} \left(g^2(u) + g'(u)(\Phi(u) - k)_+ \right) u^{(m_i-1)(p_i-1)} |u_{x_i}|^{p_i} \zeta^{p_n} dxdt \leq \\ & \leq \gamma \iint_{A_{k,\eta,s}} (\Phi(u) - k)_+^2 |\zeta_t| \zeta^{p_n-1} dxdt + \\ & + \gamma \sum_{i=1}^n \iint_{A_{k,\eta,s}} \left(\sum_{j=1}^n g^2(u) u^{(m_j-1)(p_j-1)} |u_{x_j}|^{p_j} \zeta^{p_n} \right)^{1-\frac{1}{p_i}} \times \\ & \times g^{p_i-1}(u) u^{(m_i-1)\frac{p_i-1}{p_i}} (\Phi(u) - k)_+ |\zeta_{x_i}| \zeta^{\frac{p_n}{p_i}-1} dxdt. \end{aligned}$$

З останньої формули, використовуючи нерівність Юнга і очевидну нерівність $\frac{\Phi(u)}{g(u)} \leq \delta(u)$, приходимо до оцінки (9). \square

3.3 Доведення Теорема 1

Розглянемо циліндр $Q_{\theta,\tau}(x^{(0)}, t^{(0)})$ і нехай (\bar{x}, \bar{t}) довільна точка у $Q_{\sigma\theta,\sigma\tau}(x^{(0)}, t^{(0)})$.

Якщо $u(x^{(0)}, t^{(0)}) \geq (\tau^{-1} \rho^{p_n})^{\frac{1}{m_n(p_n-1)}} + \sum_{i=1}^{n-1} \left(\theta_i^{-1} \rho^{\frac{p_n}{p_i}} \right)^{\frac{p_i}{m_n(p_n-1)-m_i(p_i-1)}}$, тоді $M(\theta, \tau) =$

$\max(M(\theta,\tau), \delta(\theta,\tau)) \geq (\tau^{-1} \rho^{p_n})^{\frac{1}{m_n(p_n-1)}} + \sum_{i=1}^{n-1} \left(\theta_i^{-1} \rho^{\frac{p_n}{p_i}} \right)^{\frac{p_i}{m_n(p_n-1)-m_i(p_i-1)}}$, і отже $Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t}) \subset$

$Q_{\theta,\tau}(x^{(0)}, t^{(0)})$, де $s = (1-\sigma)\theta_n^{p_n} M^{1-m_n(p_n-1)}(\theta, \tau)$, $\eta_i = (1-\sigma)\theta_n^{p_i} M^{m_i(p_i-1)-m_n(p_n-1)}(\theta, \tau)$, $i = \overline{1, n}$. Для фіксованої сталої $k > 0$ і $l, j = 0, 1, 2, \dots$ визначемо $\alpha_l = \frac{1}{4}(1 + 2^{-1} + \dots + 2^l)$, $\eta_{i,j,l} = (\alpha_l + \frac{1}{4}2^{-j-l-1})\eta_i$, $i = \overline{1, n}$, $\eta_{j,l} = (\eta_{1,j,l}, \dots, \eta_{n,j,l})$, $s_{j,l} = (\alpha_l + \frac{1}{4}2^{-j-l-1})s$, $k_j = k(1 - 2^{-j})$, $Q_{j,l} = Q_{\eta_{j,l}, s_{j,l}}(\bar{x}, \bar{t})$, $A_{k_j, j, l} = \{(x, t) \in Q_{j,l} : F(u) > k_j\}$. Let $\zeta_j \in C_0^\infty(Q_{j,l})$, $0 \leq \zeta_j \leq 1$, $\zeta_j = 1$ in $Q_{j+1,l}$, $\left| \frac{\partial \zeta_j}{\partial x_i} \right| \leq \gamma 2^{j+l-1} \eta_i$, $i = \overline{1, n}$, $\left| \frac{\partial \zeta_j}{\partial t} \right| \leq \gamma 2^{j+l} s^{-1}$.

Застосувавши нерівність Гьольдера і Лему 1, отримаємо

$$\begin{aligned} & \iint_{A_{k_{j+1}, j+1, l}} (\Phi(u) - k_{j+1})_+^2 dxdt \leq \\ & \leq \left(\iint_{A_{k_{j+1}, j+1, l}} (\Phi(u) - k_{j+1})_+^2 \zeta_j^{p_n} \right)^{\frac{n+1}{n}} dxdt \left| A_{k_{j+1}, j+1, l} \right|^{\frac{1}{n+1}} \leq \end{aligned}$$

$$\leq \gamma \left(\sup_{|t-\bar{t}| < s_{j,l}} \int_{Q_{\eta_j,l}(\bar{x})} (\Phi(u) - k_{j+1})_+^2 \zeta_j^{p_n} dx \right)^{\frac{1}{n+1}} \times \\ \times \prod_{i=1}^n \left(\iint_{A_{k_{j+1},j,l}} \left| \left((\Phi(u) - k_{j+1})_+^2 \zeta_j^{p_n} \right)_{x_i} \right| dx dt \right)^{\frac{n}{n+1}} |A_{k_{j+1},j,l}|^{\frac{1}{n+1}} \quad (10)$$

Використовуючи нерівність $\Phi(u) - k_j \geq \frac{k}{2^{j+1}}$, яка справедлива на множині $A_{k_{j+1},j,l}$, $\frac{\Phi(u)}{g(u)} \leq \delta(u)$, оцінимо другий доданок у правій частині (10):

$$\iint_{A_{k_{j+1},j,l}} \left| \left((\Phi(u) - k_{j+1})_+^2 \zeta_j^{p_n} \right)_{x_i} \right| dx dt \leq \gamma \iint_{A_{k_{j+1},j,l}} g(u) (\Phi(u) - k_{j+1})_+ |u_{x_i}| \zeta_j^{p_n} dx dt + \\ + \gamma \iint_{A_{k_{j+1},j,l}} (\Phi(u) - k_{j+1})_+^2 \left| \frac{\partial \zeta_j}{\partial x_i} \right| \zeta_j^{p_n-1} dx dt \leq \\ \leq \gamma 2^j k^{-\frac{p_i-1}{p_i}} \left(\iint_{A_{k_{j+1},j,l}} g^2(u) u^{(m_i-1)(p_i-1)} |u_{x_i}|^{p_i} \zeta_j^{p_n} dx dt \right)^{\frac{1}{p_i}} \times \\ \times \left(\iint_{A_{k_{j+1},j,l}} \left(\frac{\Phi(u)}{g(u)} \right)^{\frac{p_i}{p_i-1}} g(u) u^{m_n-m_i} f(u) (\Phi(u) - k_j)_+ \zeta_j^{p_n} dx dt \right)^{\frac{p_i-1}{p_i}} + \\ + \gamma \iint_{A_{k_j,j,l}} (\Phi(u) - k_j)_+^2 \left| \frac{\partial \zeta_j}{\partial x_i} \right| \zeta_j^{p_n-1} dx dt \leq \\ \leq \gamma 2^j k^{-\frac{p_i-1}{p_i}} \delta(\theta, \tau) M^{\frac{m_n-m_i}{p_i}(p_i-1)}(\theta, \tau) \left(\iint_{A_{k_j,j,l}} g^2(u) u^{(m_i-1)(p_i-1)} |u_{x_i}|^{p_i} \zeta_j^{p_n} dx dt \right)^{\frac{1}{p_i}} \times \\ \times \left(\iint_{A_{k_j,j,l}} g(u) f(u) (\Phi(u) - k_j)_+ \zeta_j^{p_n} dx dt \right)^{1-\frac{1}{p_i}} + \gamma \iint_{A_{k_j,j,l}} (\Phi(u) - k_j)_+^2 \left| \frac{\partial \zeta_j}{\partial x_i} \right| dx dt \quad (11)$$

Обираючи k з умови

$$k \geq \theta_n^{-p_n} \delta(\theta, \tau) M^{m_n p_n - 1}(\theta, \tau),$$

та використовуючи Лему 3, з (10), (11) маємо

$$y_{j+1,l} = \iint_{A_{k_{j+1},j+1,l}} (\Phi(u) - k_{j+1})_+^2 dxdt \leq \gamma(1-\sigma)^{-\gamma} 2^{(j+l)\gamma} k^{-\frac{2}{n+1}} |Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})|^{-\frac{1}{n+1}} y_{j,l}^{1+\frac{1}{n+1}}.$$

Нехай $Q_l = Q_{\alpha_l \eta, \alpha_l s}$, $\Phi_l = \sup_{Q_l} \Phi(u)$, з Лема 2 випливає, що $y_{j,l} \rightarrow 0$, коли $j \rightarrow \infty$, за умови, що k задовольняє рівності

$$k^2 = \gamma(1-\sigma)^{-\gamma} 2^{\gamma l} |Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})|^{-1} \iint_{Q_{l+1}} \Phi^2(u) dxdt.$$

Якщо $\varepsilon \in (0, 1)$, тоді з попередньої нерівності отримаємо

$$\begin{aligned} \Phi_l &\leq \gamma \theta_n^{-pn} \delta(\theta, \tau) M^{m_n p_n - 1}(\theta, \tau) + \\ &+ \gamma(1-\sigma)^{-\gamma} 2^{\gamma l} \delta^{\frac{1}{2}}(\theta, \tau) M^{\frac{m_n - 1}{2}}(\theta, \tau) \Phi_{l+1}^{\frac{1}{2}} |Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})|^{-\frac{1}{2}} \left(\iint_{Q_{\frac{\eta}{2}, \frac{s}{2}}(\bar{x}, \bar{t})} f(u) dxdt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \\ &\leq \varepsilon \Phi_{l+1} + \gamma \theta_n^{-pn} \delta(\theta, \tau) M^{m_n p_n - 1}(\theta, \tau) + \\ &+ \gamma \varepsilon^{-1} (1-\sigma)^{-\gamma} 2^{\gamma l} \delta(\theta, \tau) M^{m_n - 1}(\theta, \tau) |Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})|^{-1} \iint_{Q_{\frac{\eta}{2}, \frac{s}{2}}(\bar{x}, \bar{t})} f(u) dxdt, \quad l = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

З цього за допомогою ітерацій приходимо до оцінки

$$\begin{aligned} \Phi(u(\bar{x}, \bar{t})) &\leq \Phi_0 \leq \varepsilon^l \Phi_l + \gamma \varepsilon^{-1} \sigma^{-\gamma} \sum_{i=0}^{l-1} (\varepsilon 2^\gamma)^i \times \\ &\times \left(\theta_n^{-p} \delta(\theta, \tau) M^{m_n p_n - 1}(\theta, \tau) + \delta(\theta, \tau) M^{m_n - 1}(\theta, \tau) |Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})|^{-1} \iint_{Q_{\frac{\eta}{2}, \frac{s}{2}}(\bar{x}, \bar{t})} f(u) dxdt \right), \end{aligned}$$

для кожного $l \geq 1$.

Оберемо $\varepsilon = 2^{-\gamma-1}$, щоб сума у правій частині була збіжним рядом, коли $l \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} \Phi(u(\bar{x}, \bar{t})) &\leq \gamma(1-\sigma)^{-\gamma} \theta_n^{-pn} \delta(\theta, \tau) M^{m_n p_n - 1}(\theta, \tau) dxdt + \\ &+ \gamma(1-\sigma)^{-\gamma} \delta(\theta, \tau) M^{m_n - 1}(\theta, \tau) |Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})|^{-1} \iint_{Q_{\frac{\eta}{2}, \frac{s}{2}}(\bar{x}, \bar{t})} f(u) dxdt. \end{aligned} \quad (12)$$

Нехай $\xi \in C_0^\infty(Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t}))$, $0 \leq \xi \leq 1$, $\xi = 1$ у $Q_{\frac{\eta}{2}, \frac{s}{2}}(\bar{x}, \bar{t})$, $\left| \frac{\partial \xi}{\partial x_i} \right| \leq \gamma \eta_i^{-1}$, $i = \overline{1, n}$, $\left| \frac{\partial \xi}{\partial t} \right| \leq \gamma s^{-1}$. Щоб оцінити інтеграл у правій частині формули (12), у інтегральну тотожність (4) підставимо функцію $\varphi = \frac{u}{u+\varepsilon} \xi^{p_n}$. Використовуючи умову (2), нерівність Гьольдера і переходячи до границі, коли $\varepsilon \rightarrow 0$, отримаємо

$$\iint_{Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})} f(u) \xi^{p_n} dx dt \leq \gamma \iint_{Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})} u |\xi_t| \xi^{p_n-1} dx dt +$$

$$+ \gamma \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \iint_{Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})} |u_{x_i}|^{p_j} \xi^{p_n} dx dt \right)^{1-\frac{1}{p_i}} \left(\iint_{Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})} |\xi_{x_i}|^{p_i} dx dt \right)^{\frac{1}{p_i}}.$$

Тепер підставляючи в інтегральну тотожність (4) пробну функцію $\varphi = u \xi^{p_n}$, використовуючи умову (2) і нерівність Юнга, маємо

$$\iint_{Q_{\eta,s}(\bar{x}, \bar{t})} f(u) \xi^{p_n} dx dt \leq \gamma M(\theta, \tau) |Q_\eta(\bar{x})|. \quad (13)$$

Комбінуючи нерівності (12), (13), приходимо до оцінки

$$\Phi(u(\bar{x}, \bar{t})) \leq \gamma \sigma^{-\gamma} \theta^{-p_n} \delta(\theta, \tau) M^{m_n p_n - 1}(\theta, \tau). \quad (14)$$

Оскільки (\bar{x}, \bar{t}) була довільна точка з циліндру $Q_{\sigma\theta, \sigma\tau}(x^{(0)}, t^{(0)})$, тоді з нерівності (14) виходить необхідна оцінка (6), що доводить Теорему 1.

Цитована література

1. *Bandle K., Marcus M.* Large solutions of semilinear elliptic equations: Existence, uniqueness and asymptotic behavior // *Jl. d'Anal. Math.* – 1992. – V. 58. – P. 9–24.
2. *Keller J.B.* On the solutions of $\Delta u = f(u)$ // *Comm. Pure Applied Math.* – 1957. – V. 10. – P. 503–510.
3. *Osserman R.* On the inequality $-\Delta u \geq f(u)$ // *Pacific J. Math.* – 1957. – V. 7, N. 4. – P. 1641–1647.
4. *Vazquez J.L.* An a priori interior estimate for the solutions of a nonlinear problem representing weak diffusion // *Nonlinear Anal.* – 1981. – V. 5. – P. 95–103.
5. *Kovalevsky A.A., Skrypnik I.I., Shishkov A.E.* Singular Solutions of Nonlinear Elliptic and Parabolic Equations, De Gruyter, Series in Nonl. Analysis and Applications, Berlin, 2016.
6. *Marcus M., Veron L.* Nonlinear second order elliptic equations involving measures, Berlin, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2014.
7. *Radulescu V.D.* Singular phenomena in nonlinear elliptic problems: from blow-up boundary solutions to equations with singular nonlinearities // *Handb. Differ. Equat., North-Holland, Amsterdam.* – 2007. – P. 485–593.
8. *Veron L.* Singularities of Solution of Second Order Quasilinear Equations, Pitman Research Notes in Mathematics Series, Longman, Harlow, 1996.
9. *Cirstea F.C., Vetois J.* Fundamental solutions for anisotropic elliptic equations: existence and a priori estimates // *Comm. PDE.* – 2015. – V. 40, N. 4. – P. 727–767.

10. *Garcia-Melian J., Rossi J.D., Sabina de Lis J.C.* Large solutions to an anisotropic quasilinear elliptic problem // *Annali di Matematica Pura ed Applicata.* – 2010. – V. 189. – P. 689–712.
11. *Namlyeyeva Yu.V., Shishkov A.E., Skrypnik I.I.* Isolated singularities of solutions of quasilinear anisotropic elliptic equations // *Adv. Nonlinear Stud.* – 2006. – V. 6. – P. 617–641.
12. *Namlyeyeva Yu.V., Shishkov A.E., Skrypnik I.I.* Removable isolated singularities for solutions of doubly nonlinear anisotropic parabolic equations // *Applicable Analysis.* – 2010. – V. 10 – P. 1559–1574.
13. *Skrypnik I.I.* Removability of an isolated singularity for anisotropic elliptic equations with absorption // *Mat. Sb.* – 2008. – V. 199, N. 7. – P. 85–102.
14. *Skrypnik I.I.* Removability of isolated singularity for anisotropic parabolic equations with absorption // *Manuscr. Math.* – 2013. – V. 140. – P. 145–178.
15. *Skrypnik I.I.* Removable singularities for anisotropic elliptic equations // *Potential Anal.* – 2014. – V. 41. – P. 1127–1145.
16. *Vetois J.* Strong maximum principles for anisotropic elliptic and parabolic equations // *Advanced Nonlinear Studies.* – 2016. – V. 12. – P. 101–114.
17. *Vetois J.* A priori estimates for solutions of anisotropic elliptic equations // *Nonlin. Anal.* – 2009. – V. 71, N. 9. – P. 3881–3905.
18. *Vetois J.* The blow-up of critical anisotropic equations with critical directions // *Nonlinear Differ. Equ. Appl.* – 2011. – V. 18. – P. 173–197.
19. *Kolodij I.M.* On boundedness of generalized solutions of parabolic differential equations // *Vestnik Moskov. Gos. Univ.* – 1971. – V. 5. – P. 25–31.
20. *Ладьяженская О.А., Уральцева Н.Н.* Линейные и квазилинейные уравнения эллиптического типа. Изд. 2-е, перераб. – Москва : Наука, 1973. – 576 с.
21. *DiBenedetto E.* Degenerate Parabolic Equations. Universitext, Springer–Verlag, New York, 1993.

References

1. *Bandle K., Marcus M.* (1992). Large solutions of semilinear elliptic equations: Existence, uniqueness and asymptotic behavior. *Jl. d'Anal. Math.*, V. 58, pp. 9–24.
2. *Keller J.B.* (1957). On the solutions of $\Delta u = f(u)$. *Comm. Pure Applied Math.*, V. 10, pp. 503–510.
3. *Osserman R.* (1957). On the inequality $-\Delta u \geq f(u)$. *Pacific J. Math.*, V. 7, N. 4, pp. 1641–1647.
4. *Vazquez J.L.* (1981). An a priori interior estimate for the solutions of a nonlinear problem representing weak diffusion. *Nonlinear Anal.*, V. 5, pp. 95–103.
5. *Kovalevsky A.A., Skrypnik I.I., Shishkov A.E.* (2016). Singular solutions of nonlinear elliptic and parabolic equations, De Gruyter, Series in Nonl. Analysis and Applications, Berlin.
6. *Marcus M., Veron L.* (2014). Nonlinear second order elliptic equations involving measures, Berlin, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.
7. *Radulescu V.D.* (2007). Singular phenomena in nonlinear elliptic problems: from blow-up boundary solutions to equations with singular nonlinearities. *Handb. Differ. Equat.*, North-Holland, Amsterdam, pp. 485–593.
8. *Veron L.* (1996). Singularities of Solution of Second Order Quasilinear Equations, Pitman Research Notes in Mathematics Series, Longman, Harlow.
9. *Cirstea F.C., Vetois J.* (2015). Fundamental solutions for anisotropic elliptic equations: existence and a priori estimates. *Comm. PDE.* , V. 40, N. 4, pp. 727–767.
10. *Garcia-Melian J., Rossi J.D., Sabina de Lis J.C.* (2010). Large solutions to an anisotropic quasilinear elliptic problem. *Annali di Matematica Pura ed Applicata*, V. 189, pp. 689–712.
11. *Namlyeyeva Yu.V., Shishkov A.E., Skrypnik I.I.* (2006). Isolated singularities of solutions of quasilinear anisotropic elliptic equations. *Adv. Nonlinear Stud.*, V. 6, pp. 617–641.
12. *Namlyeyeva Yu.V., Shishkov A.E., Skrypnik I.I.* (2010). Removable isolated singularities for solutions of doubly nonlinear anisotropic parabolic equations. *Applicable Analysis*, V. 10, pp. 1559–1574.

13. Skrypnik I.I. (2008). Removability of an isolated singularity for anisotropic elliptic equations with absorption. *Mat. Sb.*, V. 199, N. 7, pp. 85–102.
14. Skrypnik I.I. (2013). Removability of isolated singularity for anisotropic parabolic equations with absorption. *Manuscr. Math.*, V. 140, pp. 145–178.
15. Skrypnik I.I. (2014). Removable singularities for anisotropic elliptic equations. *Potential Anal.*, V. 41, pp. 1127–1145.
16. Vetois J. (2016). Strong maximum principles for anisotropic elliptic and parabolic equations. *Advanced Nonlinear Studies*, V. 12, pp. 101–114.
17. Vetois J. (2009). A priori estimates for solutions of anisotropic elliptic equations. *Nonlin. Anal.*, V. 71, N. 9, pp. 3881–3905.
18. Vetois J. (2011). The blow-up of critical anisotropic equations with critical directions. *Nonlinear Differ. Equ. Appl.*, V. 18, pp. 173–197.
19. Kolodij I.M. (1971). On boundedness of generalized solutions of parabolic differential equations. *Vestnik Moskov. Gos. Univ.*, V. 5, pp. 25–31.
20. Ladyzhenskaya O.A., Ural'tseva N.N. (1968). *Linear and quasilinear elliptic equations*, Academic Press, New York (in Russian).
21. DiBenedetto E. (1993). *Degenerate Parabolic Equations*. Universitext, Springer-Verlag, New York.

M.A. Shan

Keller-Osserman a priori estimates for doubly nonlinear anisotropic parabolic equations with absorption term.

We are concerned with divergence type quasilinear parabolic equation with measurable coefficients and lower order terms model of which is a doubly nonlinear anisotropic parabolic equations with absorption term. This class of equations has numerous applications which appear in modeling of electrorheological fluids, image precessing, theory of elasticity, theory of non-Newtonian fluids with viscosity depending on the temperature. But the qualitative theory doesn't construct for these anisotropic equations. So, naturally, that during the last decade there has been growing substantial development in the qualitative theory of second order anisotropic elliptic and parabolic equations. The main purpose is to obtain the pointwise upper estimates in terms of distance to the boundary for nonnegative solutions of such equations. This type of estimates originate from the work of J. B. Keller, R. Osserman, who obtained a simple upper bound for any solution, in any number of variables for Laplace equation. These estimates play a crucial role in the theory of existence or nonexistence of so called large solutions of such equations, in the problems of removable singularities for solutions to elliptic and parabolic equations. Up to our knowledge all the known estimates for large solutions to elliptic and parabolic equations are related with equations for which some comparison properties hold. We refer to I.I. Skrypnik, A.E. Shishkov, M. Marcus, L. Veron, V.D. Radulescu for an account of these results and references therein. Such equations have been the object of very few works because in general such properties do not hold. The main ones concern equations only in the precise choice of absorption term $f(u) = u^q$. Among the people who published significative results in this direction are I.I. Skrypnik, J. Vetois, F.C. Cirstea, J. Garcia-Melian, J.D. Rossi, J.C. Sabina de Lis. The main result of the paper is a priori estimates of Keller-Osserman type for nonnegative solutions of a doubly nonlinear anisotropic parabolic equations with absorption term that have been proven despite of the lack of comparison principle. To obtain these estimates we exploit the method of energy estimations and De Giorgi iteration techniques.

Keywords: *a priori estimates, anisotropic parabolic equations.*

М.А. Шань

Априорные оценки типа Келлера-Оссермана для дважды нелинейных анизотропных параболических уравнений с абсорбцией.

Получены поточечные оценки сверху для решений дважды нелинейных анизотропных параболических уравнений с абсорбционным членом в терминах расстояния до границы. Оценки такого типа берут свое начало в работах Дж. Келлера, Р. Оссермана и имеют значение для так называемых больших решений.

Ключевые слова: априорные оценки, анизотропные параболические уравнения.

Донецький національний університет імені Василя Стуса,
вул.600-річчя 21, 21021 Вінниця, Україна
shan_maria@ukr.net

Отримано 25.09.18